

乳房假體及與乳房假體有關的 間變性大細胞淋巴瘤 (BIA-ALCL)


因應本港衛生署發出Allergan停產並回收BioCell型號乳房假體的安全警示，本中心特意提供相關最新資訊。

根據美國食品藥物管理局(FDA)建議，已置入上述假體之人士如無任何BIA-ALCL症狀，毋需過份憂慮，只需每年檢查假體一次，不用移除。如有疑問，請與本中心或您的主診醫生聯絡。

甚麼是與乳房假體有關的間變性大細胞淋巴瘤 (BIA-ALCL)?

BIA-ALCL是一種非常罕見的淋巴瘤，生長於圍繞乳房假體的包膜，早期治癒率很高。業界至今對此病未完全了解，但不將之分類為乳癌。自1997年至今，全球已售出約3,500萬個乳房假體，至今已知BIA-ALCL個案為570多宗。

與乳房假體有關的間變性大細胞淋巴瘤 (BIA-ALCL) 示意圖



哪一類假體受影響?

不少乳房假體的表面都有紋理，為全球外科醫生使用。現時發現與BIA-ALCL有關的乳房假體只限表面有紋理的一款。至今未有任何個案確認與表面光滑的乳房假體有關，原因未明。

根據FDA的資料顯示，在573宗BIA-ALCL個案中，481宗是在診斷時發現紋理表面的乳房假體屬Allergan出產的BioCell型號。Allergan已停止生產有關乳房假體。



FDAⁱ 及澳洲藥物管理局ⁱⁱ (TGA) 是否建議移除假體？

FDA及TGA均明確建議：如無任何症狀，不用因為有低度BIA-ALCL風險而移除或更換表面有紋理的乳房假體。

我該留意甚麼症狀？

BIA-ALCL有別於乳癌，最常見症狀是一邊乳房腫脹，其他較少見的包括乳房變硬、持續異常出疹、積液/血清腫，或觸摸乳房/腋下時發現硬塊，一般都容易察覺。如您有以上症狀，請預約檢查或在有需要時作進一步測試。超聲波掃描可偵察乳房假體周邊有沒有積液，再利用幼針抽取以作化驗。如CD30及ALK測試呈陽性反應，便可確診患有BIA-ALCL；如結果呈陰性，積液則視作良性。良性積液又名血清腫，常見於乳房假體四周，有助區別病人是否患有ALCL。

BIA-ALCL有多嚴重？

如能及早確診及治療，BIA-ALCL大多可以痊癒。全球至今有573宗BIA-ALCL個案，當中有33人死亡，估計與延誤診斷或治療不當有關。為防BIA-ALCL惡化至晚期而無法治癒，經常監察，及早驗出，絕對是重中之重。

如測試確診BIA-ALCL，該如何是好？

大部份BIA-ALCL個案都可單靠外科手術治癒，即移除紋理表面的假體及包膜，大部份病人都毋須接受放射治療或化療。如有疑問，請與本中心或您的主診醫生聯絡。

如無任何症狀，該怎麼辦？

以我們所知，現時未有任何醫療機構或衛生部門建議移除紋理表面的乳房假體。如出現上述任何病徵或症狀，建議預約接受評估。

閣下應繼續定期檢查自己的乳房假體，建議每年一次。您亦可於任何時間預約求診。

如有任何疑問或有意預約評估，歡迎聯絡本中心。

資料來源：

i. 美國食品藥物管理局 (FDA)

<https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-requests-allergan-voluntarily-recall-natrelle-biocell-textured-breast-implants-and-tissue>

ii. 澳洲藥物管理局 (TGA)

<https://www.tga.gov.au/alert/allergan-macro-textured-breast-implants-and-tissue-expanders>

整形外科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座23樓

電話：(852) 2855 6633

傳真：(852) 2892 7532

E-mail: prsc@hksh-healthcare.com

診症時間

星期一至星期五：上午十時至下午六時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

www.hksh-healthcare.com